

**Broncho-
obstruktion**

VORSICHT!
Wegen der Aerosolbildung
nur vernebeln, wenn eine
SARS-CoV Infektion
mit hoher
Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen
werden kann!

PSA bei COVID-19 Verdacht:
zusätzlich FFP3-Maske oder
Atemschutzmaske / -gerät
erforderlich

Besserung?
ja
Einnahme einer hohen
Betamimetika-Dosis
durch den Patienten?

nein
**Symptomatische
Tachykardie /
Tachyarrhythmie?**

ja
ja
Verneblung:
Erwachsene und Kinder
ab 12 Jahren:
**Salbutamol
und
Ipratropiumbromid**

nein
nein
Verneblung:
Kinder von
6 - 12 Jahren:
Salbutamol

Asthma?
O₂ - Gabe
2 - 6 l / min
SpO₂ > 92%
anstreben

COPD?
vorsichtige
O₂ - Gabe
SpO₂ > 90%
ausreichend

Asthma
O₂ - Gabe
2 - 6 l / min
SpO₂ > 92%
anstreben

NA
NotSan

Prednisolon - Äquivalent i.v.

not-
ärztliche
Therapie

erwäge: Salbutamol-
inhalationsdosis erhöhen
Bronchospasmin
langsam i.v.

NIV / NIPPV

Narkose / Intubation /
IPPV

Verneblung
3 - 5 Jahre:
Salbutamol 1,25 mg
2 Jahre
Salbutamol ~0,6 mg

Kinder 6-12 Jahre:
ggf. zusätzlich
0,25 mg Atrovent